



ඔබේ තේ ඉඩමටත් පොහොර යෙදුවාට දළ නැඳිද ?

“පොහොර දානව නං තමයි මහත්තයෝ එන් දළ ඇදෙන්නේ නැතේ.”
 “වැඩිම වුනොත් දළ රවුම 2 යි තැන්නත් 3 යි පොහොර අලලන්නේ.”
 “ඇත් අපට හමුවෙන පොහොර බාලයි. වැලි කලවම කරනව”.
 තේ කර්මාන්තයේ නියැලී සිටින කුඩා තේ වතු හිමියන්ගෙන් මෙවැනි මැයිවිලි නිරන්තරයෙන් අසන්නට ලැබේ. මොවුන්ගේ ඉඩම් පරීක්ෂා කර කරුණු විමසීමේදී අපට පෙනී යන්නේ දළ අඩු වීමට හේතුව පොහොර වල වරදක් නිසා නොව උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයක් ලබා ගැනීම සඳහා පොහොර භාවිතය පිළිබඳ විධිමත් ඇතුළත් ඔවුන්ට නොමැති වීමයි.

තේ ශාකය සැලකූ විට යොදන පොහොරෙන් විශේෂයෙන්ම නයිට්‍රජන් ශාකයට ලබා ගත හැක්කේ 35% පමණ වන අතර ඉතිරිය පහත සඳහන් පරිදි නොයෙකුත් ක්‍රම මගින් පසෙන් ඉවත් වී යයි.

1. සෝදා පාඨවට ලක්වීම
2. වාෂ්ප වීම
3. ක්ෂරණය හෙවත් පොලව යටට කීඳා බැසීම
4. වල් පැලැටි වැනි අනෙකුත් ශාක මගින් උරා ගැනීම සහ ශාක වලට ලබා ගත නොහැකි පරිදි නිර ක් රීම (පොසා පරසා)



එම නිසා යොදන පොහොරෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගැනීමට නම් ඉහත ආකාර වලින් පෝෂක ඉවත් වීම අවම කළ යුතුය. ඔබගේ ඉඩමෙන් පාංශු පෝෂක ඉවත් වී යාමට කරුණු රාශියක් බලපා හැකි අතර එම දෝෂ හඳුනා ගෙන පහත පරිදි පිළියම් යෙදීමෙන් යොදන පොහොරෙන් වැඩි ඵලදායිතාවයක් ලබා ගත හැක.

- පොහොර අවශෝෂණය වැඩි කිරීම සඳහා හොඳින් පැතිරුන මූල පද්ධතියක් අවශ්‍ය වේ. මේ සඳහා හොඳින් වැඩුණු දිරිමත් නිරෝගි පැල පමණක් ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවන්න.
- ලපටි තේ වගාවකදී, පොහොර යොදා මුල්ල කිරීම තුළින් වාෂ්පීකරණය මගින් පොහොර ඉවත් වීම අවම කළ යුතුය.
- මේරු තේ වගාවක තේ පඳුරු හොඳින් එකිනෙක යාටි ඇත්නම් පමණක් තෝර අතර පොහොර යෙදීම සිදු කළ යුතු අතර පාඨ බහුලව ඇත්නම් පොහොර යෙදීමේදී පඳුරු වටේට තනි තනිව යෙදීම සිදු කළ යුතුය.
- එක් එක් අවධියට නිර්දේශිත පොහොර මිශ්‍රණ නිර්දේශිත ප්‍රමාණයන්ගෙන් නියමාකාරයට යොදන්න
- පසේ තෙතමනය අවශ්‍ය පමණ ඇති විට පමණක් පොහොර යෙදිය යුතු අතර සවස් කාලයේදී යෙදීමෙන් වාෂ්පීකරණය මගින් සිදුවන හානිය අවම කර ගත හැක.
- නියං කාලයේදී හා තද වැසි සහිත දිනයන්හි පොහොර යෙදීමෙන් වලකින්න.
- කිසි විටෙකත් වැසි අපේක්ෂාවෙන් පසු මතට මූලික පොහොර යෙදීම සිදු නොකරන්න.
- වසරකට අවශ්‍ය පොහොර ප්‍රමාණය අස්වනු විභවය අනුව ගණනය කර සහ වසරේ අස්වනු රටාව අධ්‍යයනය කර අධි අස්වනු කාලයේදී වැඩි පොහොර ප්‍රමාණයකුත් අනෙකුත් කාලයන්හිදී අඩු පොහොර ප්‍රමාණයකුත් යෙදීම සුදුසුය.

- වසරකට නියමිත පොහොර ප්‍රමාණය වැඩි වාර ගනනකින් (පසේ තෙතමනය අනුව) යෙදීමට කටයුතු කරන්න
- ගල් වැටි හා කානු සැම පිළිසකර කිරීම, කානුගොඩ දැමීම වසරකට වරක්ම සිදු කරන්න.



- සැම කප්පාදුවකදීම භූමිය ආවරනය වන පරිදි පාඨ සිටු වීමට කටයුතු කරන්න.
- පසට හැකි පමණ කාබනික ද්‍රව්‍ය (කප්පාදු අතු, සෙවන ශාක අතු, කොළ පොහොර, කොම්පෝස්ට් වැනි) එකතු කර යොදන රසායනික පොහොර පසෙහි රඳවා ගැනීමේ හැකියාව දියුණු කරන්න.
- කප්පාදු චක්‍රයට සැරයක්වත් පසේ පී එච් අගය පරීක්ෂා කර ඩොලමයිට් යොදා පී එච් අගය 4.5 - 5.5 අතර පවත්වා ගන්න.
- උඩරට හා මැදරට කප්පාදු චක්‍රයකට වරක් හා පහතරට කප්පාදු චක්‍ර 2 කට වරක් තේ පේලි අතර පස මුල්ල කරන්න.
- කප්පාදු කිරීමට මාස 3 කට කලින් පොහොර යෙදීම නතර කර නැවත පොහොර යෙදීම මට්ටම් කපා නව දළ පැමිණීමක් සමඟ සිදු කරන්න.
- යොදන පොහොර කාර්යක්ෂමව ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට අගල් 8 - 9 ක පමණ නඩත්තු පත්‍ර තලයක් ඇති කර දළ නෙලීමේදී අර්මිඩ් ඉතිරි කර දළ නෙලන්න.
- පොහොර යෙදීමට පෙර වල් පැලැටි පාලනය කරන්න.
- පොහොර යොදා දින 10 -14 ක් ඇතුළත සිත්ක් සල්ෆේට් නිර්දේශිත පරිදි පත්‍ර මත ඉසින්න.



- හැකි සැම අවස්ථාවකම පොහොර යොදා, සෙවන ශාක කප්පාදු කර ක්ෂේත්‍රයේ සැම ස්ථානයක් ම ආවරනය වන ලෙස යෙදීමෙන් වාෂ්පීකරණය මගින් පොහොර ඉවත් වීම අවම කර ගත හැක.

කපිල කටුලන්ද